



CONCIME ORGANICO

ECO SUPER Cu

PREVENZIONE E CURA

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Carniccio fluido in sospensione con rame (Cu)

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

	%P/P	%P/V
Azoto (N) organico	3,4	4,3
Azoto (N) organico solubile	3,4	4,3
Rame(Cu) solubile in acqua	6,4	8,2
Carbonio (C) organico	10,2	13

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione massima di cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca, sale di rame (solfato)

AVVERTENZE. Agitare prima dell'uso. Evitare miscele con composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri, composti rameici. In caso di miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di compatibilità su piccole superfici. Da non venderci sfuso. Il prodotto non è infiammabile.

CARATTERISTICHE

ECO SUPER Cu è un concime liquido per uso fogliare, formulato per la prevenzione e la cura delle fisiopatie da rame carenza. Gli amminoacidi di origine naturale presenti nel formulato, favoriscono la penetrazione del metallo nelle cellule, conferendo un'elevata efficacia biologica al prodotto.

Xi - IRRITANTE N - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ECO SUPER Cu: UN 3077 CONTIENE: SOLFATO DI RAME

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. **R51/53** Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **S26** In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. **S37** Usare guanti adatti. **S56** Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. **S57** Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. **S60** Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

**CONFEZIONE PESO NETTO 7,62 Kg
equivalenti a 6 LITRI**

USI E DOSI

TAPPETO ERBOSO:

Tattamento fogliare curativo

1,2 l - 1000mq in 100 litri di acqua
in caso di necessità ogni 7 - 10 giorni

Tattamento fogliare preventivo

0,6 l -1000mq in 100 litri di acqua
1-2 applicazioni ogni 20 - 30 giorni

FRUTTIFERI (POMACEE) VITE OLIVO, ORTICOLE DA FRUTTO, ORTICOLE DA FOGLIA, PIANTE ORNAMENTALI E ALTRE COLTURE:

Tattamento Fogliare curativo

80 -100 ml/ hl
Applicazione:
ogni 7-10 giorni o in caso di necessità

Tattamento Fogliare preventivo

40 - 80 ml /hl
1- 2 applicazioni a distanza di 30 giorni

Tattamento Fogliare al suolo

0,5 - 1 kg/ 1000 mq
Evitare di bagnare le foglie con la soluzione 3 applicazioni a distanza di 15 - 20 giorni

